

Clitoroplastia

Se conoce como clitoroplastia al tratamiento sobre el clítoris que se hacemos con anestesia local mayoritariamente

1. Reducción efectiva del exceso de la piel en el capuchón del clítoris

Esta técnica se basa en la reducción del tamaño en el capuchón y pliegues hipertróficos que se encuentren en el clítoris con fines cosméticos, y menos comúnmente en los casos que se busque más exposición de la glándulas que se encuentran en el clítoris, las cuales brindarán teóricamente una mejora en la gratificación sexual.

También se realiza en la mayoría de los casos después de una labioplastia durante el mismo tiempo quirúrgico.

Su indicación precisa es en el caso de hipertrofia del capuchón del clítoris y en pacientes que refieren molestias habituales y en las relaciones sexuales en esta zona.


Ademas hay pacientes que puede reducirse el exceso de piel del capuchón con laser

2. Reducción del cuerpo del clítoris En ocasiones el clítoris sobresale sobre los labios mayores , sin exceso de piel pero incluso con apariencia de un micro pene



Bajo anestesia local de forma aislada o en el curso de otras cirugías íntimas como Vaginoplastia, labioplastia etc.

Es imprescindible la realización de un examen completo de los genitales externos con el fin de identificar el tipo de problema y cirugía de corrección. La eliminación del exceso de la piel del capuchón del clítoris mediante extirpación quirúrgica mediante retracción de la piel sobrante del capuchón mediante Laser.



En muchas mujeres hay que hacer la cirugía del clítoris y además otra como labioplastia, rejuvenecimiento vaginal etc.

C/ Orense 29, 2ªA, Esc.Dcha Tlf: 915568079 **Madrid**

Gran Vía 24, 1ªA TIF: 97 621 36 66 **Zaragoza**